

ODBITKA

z „Kosmosu“, czasopisma Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika
Tom LVIII. Zeszyt I—IV. 1933. Serja A. Rozprawy

EXTRAIT

du „Kosmos“ Journal de la Société Polonaise des Naturalistes „Kopernik“
Vol. LVIII. Fasc. I—IV. 1933. Série A. Mémoires



JANUSZ DOMANIEWSKI

896

Przegląd krajowych form nadrzędu Herodiones

[Übersicht einheimischer Formen der Superordo
Herodiones]

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
BIBLIOTEKA
896



LWÓW

PIERWSZA ZWIĄZKOWA DRUKARNIA WE LWOWIE, UL. LINDEGO L. 4

1933

Przegląd krajowych form nadrzędu

Herodiones

[Übersicht der heimischen Formen des Ordns *Herodiones*]

ODBITKA

z „Kosmosu“, czasopisma Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika
Tom LVIII. Zeszyt I—IV. 1933. Serja A. Rozprawy

EXTRAIT

du „Kosmos“ Journal de la Société Polonaise des Naturalistes „Kopernik“
Vol. LVIII. Fasc. I—IV. 1933. Série A. Mémoires

Przedstawiciele nadrzędu *Herodiones*, a mianowicie krajowe gatunki dadzą się określać według następującego klucza:

- | | | | |
|----|---|--|--------------------------|
| 1. | { | — Dziób krótki, na brzegach zaopatrzony w rogowe blaszki, u ptaków dorosłych w środku silnie załamany ku dołowi. | <i>Ph. r. antiquorum</i> |
| | | — Dziób mniej lub więcej wydłużony postawiony. Blaszki. | 2 |
| 2. | { | — Wewnętrzny brzeg pazura środkowego palca załamywany. | 3 |
| | | — Wewnętrzny brzeg pazura środkowego palca nie załamywany. | 10 |
| 3. | { | — Skrzydła powyżej 15 cm. | <i>L. minutus</i> |
| | | — Skrzydła powyżej 15 cm. | 4 |

Polski Związek Łowiacki
BIBLIOTEKA
Nr. 896

Dom
Pre

z "Kosmosu", czasopiśmie Polskiego Tow. Przyrodniców im. Kopernika
Tom LVIII. Zeszyt I-IV. 1933. Serja A. Kozdrowy.

EXTRAIT

du "Kosmos", Journal de la Société Polonaise des Naturalistes "Kopernik"
Vol. LVIII. Fasc. I-IV. 1933. Série A. Mémoires



Przegląd krajowych form nadrzędu *Herodiones*

[Übersicht einheimischer Formen der Superordo *Herodiones*]

Napisał

JANUSZ DOMANIEWSKI

Nadrząd *Herodiones* obejmuje trzy rzędy: *Ardeiformes*, *Ciconiiformes* i *Phaenicopteriformes*. Z nich rząd *Ardeiformes* rozpada się na trzy rodziny: *Scopidae*, *Balaenicipitidae* i *Ardeidae*. Z tych rodzin w Polsce reprezentowana jest tylko rodzina *Ardeidae*. Rząd *Ciconiiformes* obejmuje trzy rodziny: *Plataleidae*, *Ibididae* i *Ciconiidae*. Wszystkie te rodziny są reprezentowane w faunie Polski. Wreszcie rząd *Phaenicopteriformes* obejmuje jedną tylko rodzinę *Phaenicopteridae*, należącą do naszej fauny.

Przedstawiciele nadrzędu *Herodiones*, a mianowicie krajowe gatunki dadzą się określać według następującego klucza:

- | | | | |
|----|---|---|--------------------------|
| 1. | { | — Dziób krótki, na brzegach zaopatrzony w rogowe blaszki, u ptaków dorosłych w środku silnie załamany ku dołowi | <i>Ph. r. antiquorum</i> |
| | | — Dziób mniej lub więcej wydłużony pozbawiony blaszek | 2 |
| 2. | { | — Wewnętrzny brzeg pazura środkowego palca zazębiony | 3 |
| | | — Wewnętrzny brzeg pazura środkowego palca niezazębiony | 10 |
| 3. | { | — Długość skrzydła poniżej 18 cm | <i>I. minutus</i> |
| | | — Długość skrzydła powyżej 18 cm | 4 |

4. { — Skrzydła całkowicie lub w większej części białe 5
 { — Skrzydła nie białe 7
5. { — Długość skrzydła powyżej 39 cm *C. albus*
 { — Długość skrzydła poniżej 39 cm 6
6. { — Na szyi występują podłużne ciemne strychy
 { — Szyja bez strychowania *A. ralloides*
E. garzetta
7. { — Długość dzioba poniżej 90 mm 8
 { — Długość dzioba powyżej 90 mm 9
8. { — Lotki popielate lub popielate z białymi czubkami.
 { — Lotki brunatne, poprzecznie rdzawo pręgowane
N. nycticorax
B. stellaris
9. { — Wierzch głowy czarny lub rdzawo-brunatny. Szyja
 z barwą rdzawą *A. purpurea*
 { — Wierzch głowy biały lub popielaty. Szyja bez
 barwy rdzawej *A. cinerea*
10. { — Dziób łopatomato na końcu rozszerzony *P. leucorodia*
 { — Dziób na końcu nierozszerzony 11
11. { — Dziób łukowato ku dołowi zagięty *P. falcinellus*
 { — Dziób prosty 12
12. { — Głowa i szyja barwy białej *C. ciconia*
 { — Głowa i szyja barwy czarnej lub ciemno-bru-
 natnej *C. nigra*

Ardeidae.

Ardea Linn.

Ardea Linnaeus 1758, Syst. Nat., Ed. X, 1, p. 141; (typ rodzaju:
Ardea cinerea Linn.).

Ardea cinerea cinerea (Linn.).

Ardea cinerea Linnaeus 1758, Syst. Nat., Ed. X, 1, p. 143;
 (terra typica: Szwecja).

Gnieździ się pojedynczo lub w kolonjach rozrzuconych
 po całym kraju. Poza tem pokazuje się począwszy od wczesnej

wiosny aż po późną jesień nad wszystkimi wodami. Niekiedy, o ile wody nie zamarzają, daje się widywać i zimą.

Przejrzany materiał:

1. P. M. Z. ♀. 16/V. 1893. Willanów, pow. Warszawa, woj. Warszawa.
2. P. M. Z. ♂. 8/XII. 1917. Bielany, pow. Warszawa, woj. Warszawa.
3. P. M. Z. ♀. 5/VI. 1930. Rydwan, pow. Łowicz, woj. Warszawa.
4. P. M. Z. ♂. 14/VII. 1931. Siedliszczki, pow. Lublin, woj. Lublin.
5. P. M. Z. ♀. 6/X. 1931. Tyśmienica, pow. Włodawa, woj. Lublin.
6. M. D. ♀. 6/IV. 1851. Zarzecze, pow. Jarosław, woj. Lwów.
7. M. D. ♂. 25/IV. 1877. Turynka, pow. Żółkiew, woj. Lwów.
8. M. D. 12/VIII. 1928. Świsłocz, pow. Grodno, woj. Białystok.
9. M. D. juv. 21/V. 1864. Wertelka, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
10. M. D. juv. 21/V. 1864. Wertelka, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
11. M. T. ♂. 25/IV. 1889. Tatry.
12. S. Z. ♂. wiosna 1929. Koty, pow. Siedlce, woj. Lublin.

Ardea purpurea purpurea (Linn.).

Ardea purpurea Linnaeus 1766, Syst. Nat., Ed. XII, 1, p. 236;
(„Habitat in Oriente“).

Gnieździ się w Małopolsce wschodniej. W innych częściach Polski pokazuje się jako ptak zalatujący, w niektóre lata dość pospolity, lecz naogół rzadki. W tych okolicach Polski, które graniczą z jej krainą gniazdowania, spotyka się częściej niż w innych.

Przejrzany materiał:

1. M. D. ♀. 9/XII. 1912. Babin, pow. Kałusz, woj. Stanisławów.
2. M. D. 28/IV. 1881. Kołomyja, woj. Stanisławów.
3. M. D. ♀. 11/IX. 1855. Poturzyca, pow. Sokal, woj. Lwów.
4. M. D. ♂. VIII. 1909. Niesłuchów, pow. Kamionka Strumiłowa, woj. Tarnopol.
5. M. D. ♂. 19/IV. 1874. Gródek, woj. Lwów.
6. M. T. ♂. 20/V. 1887. Czarny Dunajec, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.

Poza tem w P. M. Z. znajduje się około 10 okazów, przeważnie ze zbiorów Taczanowskiego, niedatowanych dokładnie, jedynie z napisami: „Polonia“ lub „Galicia“.

P. M. Z. — oznacza Państwowe Muzeum Zoologiczne w Warszawie, M. D. — Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, M. T. — Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, S. Z. — zbiory p. Stanisława Zielińskiego w Siostrzytowie.

***Casmerodius* Glog.**

Casmerodius Gloger 1842, Hand- und Hilfsb. Naturg., 1841, p. 412; (typ rodzaju: *Ardea egretta* Gm.).

***Casmerodius albus albus* (Linn.).**

Ardea alba Linnaeus 1758, Syst. Nat., Ed. X, 1. p. 144; („Habitat in Europa“).

Gnieździ się, a przynajmniej gnieździła się do niedawna w Małopolsce wschodniej. W częściach Polski przytykających do jej krainy gniazdowania pojawia się jako ptak zalatujący, jednak dość rzadko. W innych okolicach Polski jest bardzo rzadkim ptakiem zalatującym.

Przejrany materiał:

1. M. D. ♀. 8/IV. 1880. Rasztowce, pow. Skałat, woj. Tarnopol.
2. M. D. ♂. 15/VIII. 1851. Poturzyca, pow. Sokal, woj. Lwów.
3. M. D. pull. 21/V. 1864. Wertelka, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
4. M. D. pull. 27/V. 1864. Wertelka, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
5. M. D. pull. 31/V. 1864. Wertelka, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
6. M. D. ♀. 17/IX. 1854. Poturzyca, pow. Sokal, woj. Lwów.
7. M. D. ♂. 9/IV. 1863. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
8. M. D. 2/V. 1864. Wertelka, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
9. M. D. VI. 1925. Hujcze, pow. Rawa Ruska, woj. Lwów.
10. M. D. ♂. 14/IX. 1890. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
11. M. D. 26/II. 1888. Zahajpol, pow. Kołomyja, woj. Stanisławów.
12. M. D. 2/V. 1864. Wertelka, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
13. M. D. ♀. 25/VII. 1851. Poturzyca, pow. Sokal, woj. Lwów.
14. M. T. 18/V. 1883. Czarny Dunajec, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.

Poza tem w P. M. Z. znajdują się trzy okazy ze zbiorów Taczanowskiego niedokładnie datowane, z nich jeden zabity w Łomży.

***Egretta* Forst.**

Egretta Forster 1817, Syn. Cat. Brit. Bds., p. 59; (typ rodzaju: *Ardea garzetta* Linn.).

***Egretta garzetta garzetta* (Linn.).**

Ardea Garzetta Linnaeus 1766, Syst. Nat., Ed. XII, 1, p. 237; („Habitat in Oriente“).

Czapla nadobna występuje w Polsce, jako bardzo rzadki ptak, zalatujący przypadkowo. We wschodniej Małopolsce pokazuje się jednak stosunkowo często, mianowicie jesienią. Poza-

tem okazy jej były strzelane w maju, lipcu i sierpniu. Bardzo być może, że gatunek ten gnieździ się w południowo-wschodniej Polsce, dotychczas jednak żadnych pewnych danych o tem nie posiadamy.

Przejrzany materiał:

1. M. D. ♀. 31/VII. 1872. Międzygóry, pow. Brody, woj. Tarnopol.
2. M. D. ♀. 28/V. 1880. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
3. M. D. ♀. 28/V. 1880. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
4. M. D. ♀. 21/VIII. 1851. Rowiszce, pow. Sokal, woj. Lwów.
5. M. D. ♂. 16/V. 1863. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
6. M. D. ♂. 28/V. 1880. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
7. M. D. ♀. 31/VII. 1872. Międzygóry, pow. Brody, woj. Tarnopol.
8. M. D. ♂. 8/V. 1880. Leszniów, pow. Brody, woj. Tarnopol.
9. M. T. V. 1883. Czarny Dunajec, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.

Ardeola Boie.

Ardeola Boie 1822, Isis, I, p. 559; (typ rodzaju: *Ardea ralloides* Scop.).

Ardeola ralloides (Scop.).

Ardeola ralloides 1769, Annus I Hist. Nat., p. 88; (Kraina).

Bardzo rzadki ptak, zalatujący przypadkowo. Częściej trafia się w Polsce południowo-wschodniej (woj. tarnopolskie, lwowskie, stanisławowskie, lubelskie), a w Małopolsce wschodniej nawet się gnieździ.

Przejrzany materiał:

1. P. M. Z. 31/V. 1899. Biała Podlaska, woj. Lublin.
2. M. D. ♂. 16/VI. 1866. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
3. M. D. ♂. 14/VI. 1863. Markopol, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
4. M. D. ♂. 4/V. 1863. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
5. M. D. ♀. 13/VI. 1863. Ratyszczce, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
6. M. D. ♀. Gródek, woj. Lwów.
7. M. D. ♂. 20/V. 1898. Założce, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
8. M. D. ♂. 26/V. 1873. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
9. M. D. ♀. 26/V. 1873. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
10. M. D. ♂. 15/V. 1879. Józefówka, pow. Rohatyn, woj. Lwów.
11. M. D. ♂. 2/VI. 1896. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
12. M. D. ♂. 16/VI. 1873. Dobrostany, pow. Gródek, woj. Lwów.
13. M. T. VIII. 1887. Czarny Dunajec, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.
14. M. T. 16/V. 1887. Czarny Dunajec, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.
15. S. Z. juv. VIII. 1928. Siostrzytów, pow. Lublin, woj. Lublin.
16. S. Z. juv. VIII. 1928. Siostrzytów, pow. Lublin, woj. Lublin.

***Nycticorax* Forst.**

Nycticorax Forster 1817, Syn. Cat. Brit, Bds., p. 59; (typ rodzaju: *Ardea nycticorax* Linn.).

***Nycticorax nycticorax nycticorax* (Linn.).**

Ardea nycticorax Linnaeus 1758, Syst. Nat., Ed. X, 1, p. 142;
(terra typica: Europa połudn.).

Niezbyt rzadki ptak, który bywa spotykany w różnych okolicach kraju, a mianowicie wiosną i latem. Dawniej gnieździł się niewątpliwie. Być może gnieździ się i obecnie, co jednak stwierdzonem nie zostało.

Przejrany materiał:

1. M. D. ♂. 13/V. 1857. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
2. M. D. 1/XII. 1871. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
3. M. D. ♂. 2/V. 1890. Poturzyca, pow. Sokal, woj. Lwów.
4. M. D. ♀. 4/IX. 1855. Wólka Poturzycka, pow. Sokal, woj. Lwów.
5. M. D. ♂. 4/IX. 1855. Wólka Poturzycka, pow. Sokal, woj. Lwów.
6. M. D. 25/IV. 1878. Czortowiec, pow. Horodenka, woj. Stanisławów.
7. M. D. 1/V. 1857. Lwów.
8. M. D. ♂. 23/IV. 1874. Horodenka, woj. Stanisławów.
9. M. D. ♂. 22/IV. 1890. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
10. M. D. ♂. 29/VIII. 1919. Naklickie Łazy, pow. Biłgoraj, woj. Lwów.

Poza tem w P. M. Z. znajdują się cztery okazy ze zbiorów Taczanowskiego datowane „Polonia“.

***Ixobrychus* Billb.**

Ixobrychus Billberg 1828, Syn. Faun, Scand., 1, II, p. 166;
(typ rodzaju: *Ardea minuta* Linn.).

***Ixobrychus minutus minutus* (Linn.).**

Ardea minuta Linnaeus 1766, Syst. Nat., Ed. XII, 1, p. 240;
(terra typica: Szwajcarja).

Bączek należy do pospolitych, jakkolwiek nielicznych ptaków gniazdowych Polski. Gnieździ się nietylko na większych obszarach błotnych, ale również niekiedy na niewielkich stawach trzciną porośniętych, a nawet w krzaczastych zaroślach brzegów wód bieżących. Na zimę odlatuje.

Przejrany materiał:

1. P. M. Z. ♀. VI. 1887. Perekale, pow. Pińsk, woj. Poleskie.
2. P. M. Z. ♂. VI. 1887. Perekale, pow. Pińsk, woj. Poleskie.
3. P. M. Z. ♀. VI. 1895. Perekale, pow. Pińsk, woj. Poleskie.
4. P. M. Z. ♂. 15/VII. 1913. Kołby, pow. Pińsk, woj. Poleskie.
5. P. M. Z. ♂. 29/IV. 1930. Piaski, pow. Kossów, woj. Poleskie.
6. P. M. Z. ♂. 8/VII. 1931. Siostrzytów, pow. Lublin, woj. Lublin.
7. P. M. Z. ♀. 10/VII. 1931. Siostrzytów, pow. Lublin, woj. Lublin.
8. M. D. ♂. 21/VII. 1855. Zawisznia, pow. Sokal, woj. Lwów.
9. M. D. 4/V. 1853. Poturzyca, pow. Sokal, woj. Lwów.
10. M. D. ♀. 10/V. 1892. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
11. M. T. ♂. 15/V. 1886. Czarny Dunajec, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.
12. S. Z. ♂. 10/V. 1931. Siostrzytów, pow. Lublin, woj. Lublin.
13. S. Z. IV. 1931. Siostrzytów, pow. Lublin, woj. Lublin.

***Botaurus* Steph.**

Botaurus Stephens 1819, w Shaw'a Gen. Zool., 11, II, p. 592;
(typ rodzaju: *Ardea stellaris* Linn.).

***Botaurus stellaris stellaris* (Linn.).**

Ardea stellaris Linnaeus 1758, Syst. Nat., Ed. X, 1, p. 144;
(terra typica: Szwecja).

Pospolity, jakkolwiek nieliczny ptak gniazdowy. Pojedyncze osobniki niekiedy zimują.

Przejrany materiał:

1. M. D. ♂. 6/IV. 1856. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
2. M. D. ♂. 19/VIII. 1862. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
3. M. T. ♂. 15/V. 1882. Chochółów, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.
4. M. T. ♀. 20/X. 1883. Witów, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.
5. S. Z. VII. 1929. Majdan Siostrzytowski, pow. Lublin, woj. Lublin.

Ciconiidae*.**Ciconia* Briss.**

Ciconia Brisson 1760, Ornith., I, p. 48, V, p. 361; (typ rodzaju:
Ardea ciconia Linn.).

***Ciconia ciconia ciconia* (Linn.).**

Ardea Ciconia Linnaeus 1758, Syst. Nat., Ed. X, 1, p. 142;
(terra typica: Szwecja).

Pospolity ptak gniazdowy, na zimę odlatuje.

Przejrzany materiał:

1. P. M. Z. ♀. 25/V. 1893. Willanów, pow. Warszawa, woj. Warszawa.
2. M. D. ♂. 3/VIII. 1896. Homiak, pow. Stanisławów, woj. Stanisławów (abnorm.).
3. M. D. ♀. 28/VIII. 1927. Barszczowice, pow. Lwów, woj. Lwów (abnorm.).
4. S. Z. VIII. 1929. Siostrzytów, pow. Lublin, woj. Lublin.
5. S. Z. IX. 1930. Oczesały, pow. Grójec, woj. Warszawa (abnorm.).

Ciconia nigra (Linn.).

Ardea nigra Linnaeus 1758, Syst. Nat., Ed. X, 1, p. 142;
(terra typica: Szwecja).

Gnieździ się na Pomorzu, w środkowej, w północno-wschodniej i wschodniej Polsce oraz w Karpatach. Na zimę odlatuje.

Przejrzany materiał:

1. P. M. Z. juv. 28/VIII. 1931. Brzóza, pow. Kozienice, woj. Kielce.
2. M. D. ♂. 5/IV. 1897. Pełkinie, pow. Jarosław, woj. Lwów.
3. M. D. ♂. 14/VIII. 1876. Brody, woj. Tarnopol.
4. M. D. pull. wiosna 1850. Dzieduszyce, pow. Stryj, woj. Stanisławów.
5. M. D. 19/VI. 1863. Międzygóry (okolice Pieniak), pow. Brody, woj. Tarnopol.
6. M. D. 15/IX. 1870. Wysocko, pow. Jarosław, woj. Lwów.
7. M. D. ♂. 8/IV. 1889. Załóżce, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
8. M. D. ♂. 17/VI. 1867. Mielnica, pow. Borszczów, woj. Tarnopol.
9. M. D. ♀. 15/VII. 1923. Sokółów, pow. Stryj, woj. Stanisławów.
10. M. T. ♂. 12/VIII. 1887. Kościeliska, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.
11. S. Z. ♀. IV. 1929. Police, pow. Kamień Koszyrski, woj. Poleskie.

*Plataleidae.**Platalea* Linn.

Platalea Linnaeus 1758, Syst. Nat. Ed. X, 1, p. 139; (typ rodzaju: *Platalea leucorodia* Linn.).

Platalea leucorodia leucorodia (Linn.).

Platalea leucorodia Linnaeus 1758, Syst. Nat., Ed. X, 1, p. 139;
(terra typica: Szwecja).

Dość rzadki ptak, zalatujący przypadkowo do różnych okolic kraju. Nie ulega wątpliwości, że przed 40—50 laty warzęcha gnieździła się w Pińszczyźnie.

Przejrzany materiał:

1. P. M. Z. VII. 1926. Piesia Wola, pow. Włodawa, woj. Lublin.
2. P. M. Z. 1893. Spytkowice, pow. Oświęcim, woj. Kraków.
3. M. D. ♂. 19/IV. 1867. Seretec, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
4. M. D. ♂. 11/VI. 1874. Ostobuż, pow. Rawa Ruska, woj. Lwów.
5. M. D. ♂. 11/VI. 1874. Ostobuż, pow. Rawa Ruska, woj. Lwów.
6. M. D. ♀. 8/VIII. 1899. Gródek, woj. Lwów.
7. M. D. ♀. 3/V. 1859. Pieniaki, pow. Brody, woj. Tarnopol.
8. M. D. ♂. 17/V. 1890. Manasterzec, pow. Stryj, woj. Stanisławów.
9. M. T. ♂. 3/V. 1883. Czarny Dunajec, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.
10. M. T. juv. 12/IX. 1884. Witów, pow. Nowy Targ, woj. Kraków.

Plegadidae.***Plegadis* Kaup.**

Plegadis Kaup 1829. Skizz. Entwicklungsgesch. Natürl. Syst. Europ. Thierw., I, p. 82; (typ rodzaju: *Tantalus falcinellus* Linn.).

***Plegadis falcinellus falcinellus* (Linn.).**

Tantalus Falcinellus Linnaeus 1766, Syst. Nat., Ed. X, 1, p: 241; („Habitat in Austruja, Italia“).

Rzadki ptak, zalatujący przedewszystkiem do południowo-wschodniej Polski.

Przejrzany materiał:

1. P. M. Z. ♀. 1/XI. 1880. Lubartów, woj. Lublin.
2. P. M. Z. V. 1859. Łomża, woj. Białystok.
3. M. D. ♂. 27/VIII. 1900. Rozwadów, pow. Tarnobrzeg, woj. Lwów.
4. M. D. ♀. 10/V. 1874. Kołodrubry, pow. Rudki, woj. Lwów.
5. M. D. ♀. 14/X. 1872. Założce, pow. Zborów, woj. Tarnopol.
6. M. D. ♂. 10/V. 1874. Kołodrubry, pow. Rudki, woj. Lwów.
7. M. D. ♀. 19/V. 1866. Urzejowice, pow. Przeworsk, woj. Lwów.
8. M. D. ♀. 5/V. 1861. Brody, woj. Tarnopol.
9. M. D. 19/IX. 1916. Nowy Kałusz, pow. Kałusz, woj. Stanisławów.

Phoenicopteridae.***Phoenicopus* Linn.**

Phoenicopus Linnaeus 1758, Syst. Nat., Ed. X, 1, p. 139; (typ rodzaju: *Phoenicopus ruber* Linn.).

Phoenicopterus ruber antiquorum (Brehm).

Phoenicopterus ruber Linnaeus 1758, Syst. Nat. Ed. X, 1, p. 139; (terra typica: Wyspy Bahama). *Phoenicopterus antiquorum* Brehm 1824, Lehrb. Naturg. europ. Vög., p. 652; („Meeresküsten des südlichen Asien, die von Afrika und Südeuropa“).

Bardzo rzadki ptak, zalatujący przypadkowo.

Przejrzany materiał:

1. P. M. Z. 20/VIII. 1914. Walewice, pow. Łowicz, woj. Warszawa.

ZUSAMMENFASSUNG.

Der Verfasser gibt eine Übersicht der in Polen einheimischen Formen aus der Superordo *Herodiones*.



Vertical text, likely a library or collection stamp, located on the right side of the page. The characters are faint and difficult to decipher, but appear to be arranged in a vertical column.



BIBLIOTEKA

Polskiego Związku Łowieckiego

896 Dom
Pne

ORN. 22.